Curacid Noro-sept –Händedesinfektion

Alkoholisches Hände- und Hautdesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit zum Besprühen oder Betupfen der Haut. **Curacid Noro-sept** ist hochwirksam gegen gramnegative und –positive Bakterien, insbesondere gegen Noro-Viren, mit einer Einwirkzeit von lediglich 30 Sekunden.

arzneilich wirksame Bestandteile auf 100g
78,3 g Ethanol 96% (V/V), vergällt mit Ethylmethylketon
sonstiger Betsandteil: gereinigtes Wasser

Anwendungsgebiete
Hygienische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße.

Wirkungsspektrum
- bakterizid inkl. TBC
- fungizid
- virusinaktivierend inkl. HIV/HBV

Gegenanzeigen
Curacid Noro-sept ist nicht zur Desinfektion großflächiger offener Wunden geeignet. Nicht auf Schleimhäuten anwenden.

Wechselwirkung mit anderen Mitteln:
Keine bekannt.

Nebenwirkungen
Bei Hauteinreibungen mit **Curacid Noro-sept** können Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten.

Warnhinweise
Nur zur äußeren Anwendung. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Dicht verschlossen lagern. Flammpunkt nach DIN 51755 18°C. Von Zündquellen fernhalten! Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Einsatzgebiete
Curacid Noro-sept ist geeignet zur hygienischen Haut- und Händedesinfektion, zur chirurgischen Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor Injektionen und für Kühlumschläge. Für Klinik, Alten- und Pflegeeinrichtung, Praxis.

Dosierung und Anwendung
Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit mindestens 3ml der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden. Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. **Curacid Noro-sept** wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

RKI gelistet
Zul.-Nr.: 2109.98.99

chemisch-physikal. Daten (bei 20°C)

Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte	0,875
Flammpunkt	18°C

Lieferformen

Art.-Nr.: 10220	100ml Kittelflasche
Art.-Nr.: 10221	500ml Flasche